



Министерство здравоохранения Пензенской области

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА ВОЗВРАЩАЕМСЯ К ЖИЗНИ!

ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ



- Осмотр врача с измерением температуры
- Сбор сведений о контактах с инфицированными
- Измерение уровня кислорода в крови и осмотр зева
- Информирование о возможных реакциях
- Заполнение информированного добровольного согласия

ВАКЦИНАЦИЯ

1 ЭТАП

Введение
компонента I
внутримышечно



2 ЭТАП

Введение
компонента II
внутримышечно
через 2-3 недели
после первой
прививки

ПОСЛЕ ПРИВИВКИ в течение 3 дней рекомендуется

- Не посещать сауну/баню
- Избегать чрезмерных физических нагрузок
- Не принимать алкоголь
- При повышении температуры можно принять нестероидные противовоспалительные препараты
- При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации можно принять антигистаминные средства



Министерство здравоохранения Пензенской области

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА ВОЗВРАЩАЕМСЯ К ЖИЗНИ!

ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ



- Осмотр врача с измерением температуры
- Сбор сведений о контактах с инфицированными
- Измерение уровня кислорода в крови и осмотр зева
- Информирование о возможных реакциях
- Заполнение информированного добровольного согласия

ВАКЦИНАЦИЯ

1 ЭТАП

Введение
компонента I
внутримышечно



2 ЭТАП

Введение
компонента II
внутримышечно
через 2-3 недели
после первой
прививки

ПОСЛЕ ПРИВИВКИ в течение 3 дней рекомендуется

- Не посещать сауну/баню
- Избегать чрезмерных физических нагрузок
- Не принимать алкоголь
- При повышении температуры можно принять нестероидные противовоспалительные препараты
- При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации можно принять антигистаминные средства



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- + Возраст до 18 лет
- + Температура тела выше 37
- + Гиперчувствительность к ранее применяемым вакцинам
- + Острое респираторное заболевание
- + Обострение хронического заболевания
- + Беременность и период грудного вскармливания
- + Со дня вакцинации от любой другой инфекции прошло менее 30 дней



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- + Возраст до 18 лет
- + Температура тела выше 37
- + Гиперчувствительность к ранее применяемым вакцинам
- + Острое респираторное заболевание
- + Обострение хронического заболевания
- + Беременность и период грудного вскармливания
- + Со дня вакцинации от любой другой инфекции прошло менее 30 дней



ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:


- ✓ Озноб
- ✓ Повышенная температура тела
- ✓ Головная боль
- ✓ Снижение аппетита
- ✓ Увеличение лимфоузлов
- ✓ Болезненность в месте инъекции, покраснение, отечность
- ✓ Тошнота, диспепсия



Эти явления обычно проходят в течение 2-3 дней.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

- ✓ Озноб
- ✓ Повышенная температура тела
- ✓ Головная боль
- ✓ Снижение аппетита
- ✓ Увеличение лимфоузлов
- ✓ Болезненность в месте инъекции, покраснение, отечность
- ✓ Тошнота, диспепсия



Эти явления обычно проходят в течение 2-3 дней.



**ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЕТЕ ПРИВИВКУ,
ТО ПРИ ВСТРЕЧЕ С COVID-19
НЕ ЗАБОЛЕЕТЕ ИЛИ ПЕРЕНЕСЕТЕ
ИНФЕКЦИЮ В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ,
БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ**

Запишитесь на вакцинацию через Госуслуги
<https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination>

После прививки продолжайте носить маски, регулярно мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.



**ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЕТЕ ПРИВИВКУ,
ТО ПРИ ВСТРЕЧЕ С COVID-19
НЕ ЗАБОЛЕЕТЕ ИЛИ ПЕРЕНЕСЕТЕ
ИНФЕКЦИЮ В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ,
БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ**

Запишитесь на вакцинацию через Госуслуги
<https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination>

После прививки продолжайте носить маски, регулярно мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.